

# RÉPUBLIQUE DU MALI



L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali (EIP Mali) a été réalisée en 2021 par l'Institut National de la Statistique (INSTAT) en étroite collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et avec l'appui technique de l'ICF à l'ensemble du projet. Le financement de l'EIP Mali 2021 a été assuré par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) à travers l'Initiative Présidentielle des Etats-Unis contre le Paludisme (PMI).

L'objectif principal de l'EIP Mali 2021 est de mesurer à l'échelle nationale les indicateurs essentiels du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) afin d'apprécier l'endémicité du paludisme et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme au Mali.

Ce tableau présente les niveaux de certains indicateurs clés du paludisme pour l'ensemble du pays, pour les 8 régions administratives (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal) et pour le District de Bamako. Il convient de noter que, pour des raisons d'insécurité, la collecte des données pour l'enquête EIP Mali 2021 n'a pas pu être menée dans toutes les grappes tirées. Les grappes concernées sont dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Ainsi, l'interprétation des résultats dans ces régions devra être faite avec prudence. Les résultats d'une analyse plus élaborée des données de l'EIP Mali 2021 seront présentés dans un rapport final.

Des renseignements concernant l'EIP Mali 2021 peuvent être obtenus auprès de l'Institut National de la Statistique (INSTAT), BP 12, Avenue du Mali, Hamdallaye ACI 2000 ; téléphone : (223) 20 22 24 55/ (223) 20 22 48 73, fax : (223) 20 22 71 45 – [direction@instat.gouv.ml](mailto:direction@instat.gouv.ml).

Pour obtenir des informations sur The DHS Program, contactez ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500 ; fax: +1-301-407-6501 ; email : [info@DHSprogram.com](mailto:info@DHSprogram.com); internet : [www.DHSprogram.com](http://www.DHSprogram.com)

## Citation recommandée :

Institut National de la Statistique (INSTAT), Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et ICF. 2021. *Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali 2021. Indicateurs Clés*. Bamako, Mali et Rockville, Maryland, USA : INSTAT, PNLN et ICF.

## Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali en 2021

### Indicateurs Clés

Institut National de la Statistique  
(INSTAT)  
Programme National de Lutte contre le Paludisme  
(PNLP)  
Bamako, Mali

The DHS Program, ICF  
Rockville, Maryland, USA

Février 2021



## INDICATEURS CLÉS DE L'ENQUÊTE SUR LES INDICATEURS DU PALUDISME AU MALI, EIP MALI 2021

La collecte des données a eu lieu du 01 septembre au 12 novembre 2021 ; nombre total de ménages enquêtés : 5 627 ; nombre total de femmes enquêtées : 10 765 ;  
l'Institut National de la Statistique (INSTAT), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Indicateur	Ensemble	Région								
		Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	Bamako
<b>MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE (MII)<sup>1</sup></b>										
Pourcentage de ménages ayant, au moins, une MII	90,9	97,0	95,0	97,7	95,1	94,2	85,6	87,7	20,8	72,5
Pourcentage de ménages ayant, au moins, une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage	44,0	58,3	47,0	61,4	51,4	34,5	33,3	37,9	4,4	22,2
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit dernière	73,4	76,6	75,2	79,7	74,3	69,5	75,8	84,7	6,6	55,8
Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes ayant dormi sous une MII la nuit dernière	75,9	79,6	81,6	83,6	72,6	71,8	72,7	91,5	4,2	51,4
Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII <sup>2</sup>	72,2	77,9	75,2	82,1	80,4	67,9	61,9	69,5	12,4	46,0
Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une MII parmi les ménages avec au moins une MII	72,7	73,6	75,5	78,2	71,7	70,2	74,6	83,5	32,7	57,8
<b>TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT PAR LES FEMMES PENDANT LA GROSSESSE</b>										
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar	56,5	60,1	63,7	57,1	48,7	49,1	33,5	62,3	12,1	70,4
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	34,6	36,5	41,6	36,8	27,7	28,1	15,3	43,2	11,2	44,4
<b>PRÉVALENCE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT PRÉCOCE DES ENFANTS AVEC DE LA FIÈVRE</b>										
Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>3</sup>	60,0	62,1	65,8	58,4	61,6	49,0	60,9	49,9	(61,6)	62,9
Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé	23,3	15,2	33,1	23,6	26,8	21,6	30,5	38,7	(5,5)	15,7
Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview qui ont pris n'importe quel antipaludique, pourcentage ayant pris une CTA <sup>4</sup>	14,8	16,5	9,4	13,2	15,6	32,3	(0,0)	(20,7)	*	8,0
<b>PRÉVALENCE DE PALUDISME</b>										
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat de test de paludisme était positif par Test de Diagnostic Rapide (TDR)	19,4	12,2	22,8	26,2	25,9	26,6	7,3	11,4	1,9	1,8

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

TDR = Test de Diagnostic Rapide SD BIOLINE Malaria Ag P.f

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EDSM-V de 2012-2013, les MII étaient appelées Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA). Depuis 2012 au Mali, toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides sont presque exclusivement des MILDA.

<sup>2</sup> Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

<sup>3</sup> Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : le secteur médical public, le secteur médical privé, les boutiques, les vendeurs de médicaments itinérants et le marché. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel et d'un guérisseur.

<sup>4</sup> CTA = Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine